




1. がん情報局について

・ 沿革

- 2005年 医療センターにてカンファレンス開始
- 2005年 浜松乳癌情報局 発足
- 2006年 浜松乳癌情報局 第1回 市民公開講座



1. がん情報局について

・ 沿革

- 2005年 医療センターにてカンファレンス開始
- 2005年 浜松乳癌情報局 発足
- 2006年 浜松乳癌情報局 第1回 市民公開講座
- 2007年 NPO法人 がん情報局 認証



2. 主な活動のご紹介

- 第3回 大腸がん 市民公開講座
 - － 平成24年4月15日
 - － アクトシティ浜松




2. 主な活動のご紹介

- 第3回 大腸がん 市民公開講座
- 参加者数 246名



2012年3月14日中日新聞



2. 主な活動のご紹介

- 第3回 大腸がん 市民公開講座
 - 参加者数 246名



2. 主な活動のご紹介

- 第3回 大腸がん 市民公開講座
 - 質問数 85件

浜松大腸がん情報局 第3回 市民公開講座	
・ 使用したスライドは、終了後にがん情報局のホームページ(http://www.ganjocho.org)でご覧いただけます。 ・ お帰りの際にアンケートを回収させていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。 ・ 次回予告 浜松大腸がん情報局 第4回 市民公開講座 平成24年5月頃を予定しています。	
質問	回答
1 大腸がんの予防はどのようにすればいいのでしょうか。	大腸がんの予防は、大腸がんの発生を抑えること、早期発見すること、早期治療することです。大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。
4 16年間にわたって大腸がんの発生を抑えることができたのは、大腸がんの検診のおかげでしょうか。	大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。
6 大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。	大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。
12 大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。	大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。
19 大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。	大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。
21 大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。	大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。
22 大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。	大腸がんの発生を抑えるためには、食事の改善、運動の増加、禁煙、禁酒などが有効です。早期発見するためには、大腸がんの検診を受けることが重要です。早期治療するためには、大腸がんの手術を受けることが重要です。

2. 主な活動のご紹介

- 第3回 大腸がん 市民公開講座
 - 質問数 85件

A2 大腸がんになりやすい人

・ 体脂肪、内臓脂肪が多く、体格がよい方が そうでない方と比較して大腸がんになりやすいとされています

↓

つまり「肥満＝高カロリー摂取が大腸がんの発生に関連している」と言えます
特に男性では肥満と大腸がんの発生が関連していると考えられています
ただし、日本人でどの程度の肥満が問題となるのかは明らかではありません

やすい人

(2合以上)

値が27以上)

合

27.6！！

男性では

平均寿命より

す

と食生活

られ研究されてきました

ってきたこと

大腸がんの危険要因
アルコール飲料（1日日本酒2合以上）
肥満
喫煙（直腸がん） 加工肉
鉄分を含む食品 動物性脂肪を含む食品 砂糖を含む食品

日本臨床2011 大腸癌より改定

2. 主な活動のご紹介

- 遠隔地多地点連携カンファレンス
 - 参加地点9か所
 - 青森県 青森市×2
 - 東京都 千代田区
 - 東京都 八王子市
 - 静岡県 浜松市
 - 大阪府 高槻市
 - 大阪府 箕面市
 - 鹿児島県 鹿児島市
 - 沖縄県 浦添市

2. 主な活動のご紹介

- 遠隔地多地点連携カンファレンス

- 月1度開催（現在42回）

- 7/19の参加者

- 医師 22名
 - 看護師 10名
 - 薬剤師 8名
 - 放射線技師 3名
 - 検査技師 3名
 - 製薬会社 3名



2. 主な活動のご紹介

- 医療従事者向け勉強会

- 医師 中部乳がん会議
 - 看護師 浜松がん看護フォーラム 21
 - 薬剤師 浜松がん薬物療法セミナー
 - ケアマネージャー


「がんになっても安心して暮らせる
ためのなかまづくり」プロジェクト

- 医療関係者向け勉強会

- 浜松オンコロジーフォーラム

2. 主な活動のご紹介

- 乳がん啓発活動
 - ピンクリボンとは
 - 乳がんの早期発見、診療、治療の大切さを伝えるシンボル



2. 主な活動のご紹介

- 乳がん啓発活動
 - ピンクうなぎリボン



ピンクうなぎリボン
ピンバッチ



2011年2月9日 中日新聞

2. 主な活動のご紹介

- 乳がん啓発活動
 - Tシャツ、募金箱、自動販売機、どら焼き…



協賛企業

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • はましん地域振興財団 | • 協和発酵キリン株式会社 |
| • 中外製薬株式会社 | • 武田薬品工業株式会社 |
| • アストラゼネカ株式会社 | • ファイザー株式会社 |
| • 大鵬薬品工業株式会社 | • エーザイ株式会社 |
| • ブリストルマイヤーズ スクイブ株式会社 | • 小野薬品工業株式会社 |
| • ノバルティスファーマ株式会社 | • 日本イーライリリー株式会社 |
| • サノフィ・アベンティス株式会社 | • 日本化薬株式会社 |
| • グラクソ・スミスクライン株式会社 | (順不同) |
| • 株式会社ヤクルト本社 | |

