

症例 2-1

76 歳、男性

腎機能、肝機能：問題なし、血算：問題なし

再発結腸がん

160cm, 56kg, 1.58 m²

Beva+XELOX 療法施行中。今回よりプロプレス追加処方。

「尿の何とかがっていう値が悪いから今回は点滴 1 つ止めましょうって」

大腸肛門科

Rp.1	ゼローダ 300mg	10 錠	分 2 朝夕食後	14 日分
			飲みきり終了です	
Rp.2	ピドキサル 10mg	6 錠	分 3 毎食後	21 日分
Rp.3	ツムラ 107 牛車腎気丸	7.5g	分 3 毎食前	21 日分
Rp.4	プロプレス 8mg	1 錠	分 1 朝食後	21 日分

整形外科

Rp.1	ロキソニン 60mg	3 錠	分 3 毎食後	21 日分
	ムコスタ 100mg	3 錠	分 3 毎食後	21 日分
Rp.2	セルタッチ	2 袋	1 日 1 回	

1. XELOX 治療はどのようなスケジュールで行う治療方法か？
2. 各薬剤の処方意図は何か？
3. 処方監査する際の注意点および疑義紹介する点はあるか？
4. 患者に何を確認し、どう説明するか？

症例 2-2

77 歳、男性

腎機能、肝機能：問題なし、血算：問題なし

再発結腸がん

167cm, 64kg, N1.72 m²

FOLFIRI 療法施行中。

大腸肛門科

Rp.1	イメンド 125mg	1 錠	分 1	朝食後	1 日分
Rp.2	イメンド 80mg	2 錠	分 1	朝食後	2 日分
Rp.3	マグラックス 500mg	3 錠	分 3	毎食後	14 日分
	ビオフェルミン	3 g	分 3	毎食後	14 日分
Rp.4	デキサルチン口腔用軟膏	1 本	1 日 1 回	塗布	

1. FOLFIRI 療法はどのようなスケジュールで行う治療方法か？
2. 各薬剤の処方意図は何か？
3. 処方監査する際の注意点および疑義紹介する点はあるか？
4. 患者に何を確認し、どう説明するか？

症例 2-3

73 歳、男性

腎機能、肝機能：問題なし、血算：問題なし

再発結腸がん

170cm, 62kg, 1.71 m³

sLV5FU2 療法施行中。

大腸肛門科

Rp.1	ピドキサール 10mg	6錠	分3 毎食後	14日分
Rp.2	ツムラ 107 牛車腎気丸	7.5g	分3 毎食前	14日分
Rp.3	ソルコセリル含嗽水	2本	1日 3~4回	

1. sLV5FU2 療法はどのようなスケジュールで行う治療方法か？
2. 各薬剤の処方意図は何か？
3. この患者には結腸がん再発治療としてどのような治療が今までなされて来たのか？
4. 患者に何を確認し、どう説明するか？