

### 症例 3-1

73 歳、女性

腎機能、肝機能：問題なし

血算：問題なし

現病歴：S 状結腸がん、多発肝転移

既往歴：心筋梗塞（ステント留置後）、高血圧症、脂質異常症（内服薬なし）、糖尿病（内服薬なし）

158cm, 61kg →1.62 m<sup>2</sup>

**mFOLFOX6+Bevacizumab 療法を初回施行後に処方された。**

外科			
Rp 1			
プリンペラン錠 5	1 錠	嘔気時	10 回分
Rp 2			
オーグメンチン配合錠 250SR	3 錠	1 日 3 回 毎食後	3 日分
		38℃以上の熱が出た時に内服	
Rp 3			
クラビット錠 500mg	1 錠	1 日 1 回 朝食後	3 日分
循環器科			
Rp 1			
バイアスピリン錠 100mg	1 錠	1 日 1 回 朝食後	14 日分
Rp 2			
ニューロタン錠 25mg	1 錠	1 日 1 回 朝食後	14 日分
Rp 3			
アーチスト錠 2.5mg	1 錠	1 日 1 回 朝食後	14 日分
Rp 4			
タケプロン OD 錠 15	1 錠	1 日 1 回 朝食後	14 日分

1. アバスチンの標的分子は何か？
2. アバスチン使用中に出現する副作用は何か？
3. 出現する副作用に対する標準的あるいは一般的な対応は何か？
4. 今回の処方で処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか？

### 症例 3-2

49 歳 女性

腎機能、肝機能：問題なし

血算：問題なし

横行結腸がん術後、卵巣転移、後腹膜転移、腹膜播種

167 cm、69 kg→1.78 m<sup>2</sup>

**FOLFIRI+Panitumumab 療法を開始となった。**

Rp.1

ヒルドイドソフト軟膏 50g 必要に応じて

Rp.2

マイザー軟膏 0.005% 10g 四肢体幹に症状出たら塗布

Rp.3

ロコイドクリーム 0.1% 10g 顔面に症状出たら塗布

Rp.4

リドメックスコーワローション 10g 頭皮に症状出たら塗布

**FOLFIRI+Panitumumab 療法 3 回目施行後に以下の処方が追加された。**

Rp.5

キシロカイン液 4% 10ml

ハチアズレ含漱用 2g/包 5 包

滅菌精製水を加えて 500ml 混用 必要に応じて

Rp.6

ミノマイシンカプセル 100 mg 3Cp 1 日 3 回 毎食後 14 日分

1. ベクティビックスの標的分子は何か？
2. ベクティビックス使用中に出現する副作用は何か？
3. 出現する副作用に対する標準的あるいは一般的な対応は何か？
4. 今回の処方で処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか？

### 症例 3-3

67 歳 女性

腎機能、肝機能：問題なし

血算：問題なし

S 状結腸がん術後再発、ダグラス窩・子宮浸潤

153 cm、55 kg→1.51 m<sup>2</sup>

**CPT-11+Cetuximab 施行中に処方された。**

外科			
Rp 1	イメンドカプセル 125mg	1Cp 1日1回	化学療法1時間前に服用 1日分
Rp 2	イメンドカプセル 80mg	1Cp 1日1回	イメンド 125mg を服用後2日目から服用 2日分
Rp 3	プリンペラン錠 5mg	1錠 吐き気時	10回分
Rp 4	ワイパックス錠 1mg	1錠	化学療法前に服用 1日分
皮膚科			
Rp.1	ボアラ軟膏 0.12%	5g	顔：赤くぶつぶつしたところ、1日1-3回
Rp.2	フルメタクリーム	5g	頭：手に取って薄く塗る
Rp.3	白色ワセリン	50g	全身使用可、1日1-3回

1. アービタックスの標的分子は何か？
2. アービタックス施行中に出現する副作用は何か？
3. 出現する副作用に対する標準的あるいは一般的な対応は何か？
4. 今回の処方でも処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか？